

後天性眼瞼下垂患者さま向け説明書

アップニークは、後天性眼瞼下垂に対して用いる点眼薬です。手術以外の治療選択肢のひとつで、通常は1日1回、片眼または両眼に1滴ずつ使用します。

適応	後天性眼瞼下垂
使い方	通常、成人では1回1滴、1日1回点眼します。
期待されること	上まぶたが開きやすくなり、見え方や見た目の改善が期待されます。
保険	自由診療（健康保険適用外）です。

1. このお薬について

- 有効成分はオキシメタゾリン塩酸塩です。
- まぶたを持ち上げる筋肉（ミュラー筋）に作用し、上まぶたを開きやすくします。
- 効果の感じ方には個人差があり、すべての眼瞼下垂に適応できるわけではありません。
- 保険診療適応外のため、**会計は保険診療と分離します（領収書は分けられます）**。

2. 使用方法

- 通常は1日1回、指示された眼に1滴点眼してください。
- コンタクトレンズは点眼前に外し、再装用は5分以上あけてください。
- 他の点眼薬も使っている場合は、5分以上間隔をあけてください。
- 1回使い切りタイプの容器は、開封後は再使用せず廃棄してください。

3. 副作用と注意点

- 主な副作用として頻度は高くありませんが、目の充血、目の刺激感、乾き、かすみ、点眼時の痛み、目の炎症、頭痛などが報告されています。
- 心疾患のある方は、医師へお知らせください。
- 妊娠中・授乳中の方、他院で治療中の方、内服薬がある方も事前にご相談ください。

4. こんなときは早めにご連絡ください

- 強い目の痛み、急な見えにくさ、まぶしさ、強い充血が出たとき
- 動悸、ふらつき、血圧の異常が疑われる症状があるとき
- 使用中に気になる症状が続くとき

5. 当院での受診スケジュール

初回処方後	1か月後に再診が必要です。
2回目以降	3か月おきの診察が必要です。
途中受診	副作用や気になる症状がある場合は、定期受診を待たずにご相談ください。

6. 費用のご案内（税込）

アップニーク 1か月分（1箱）	4,890円
診察料（初診・再初診）	3,300円
診察料（再診）	2,200円